

NEUMOSUIN

Vacuna inactivada, Pleuroneumonía porcina, en suspensión inyectable

COMPOSICIÓN:

Actinobacillus pleuropneumoniae inactivado (serotipos 2, 4 y 5).

Estimulación activa del sistema inmunitario de los animales vacunados frente a *Actinobacillus pleuropneumoniae* responsable de la Pleuroneumonía porcina.

INDICACIONES:

Porcino (cerdas gestantes, verracos, cochinos desestetados y cerdos de producción): Prevención de la Pleuroneumonía porcina.

POSOLOGÍA:

Porcino (cerdas gestantes, verracos, cochinos desestetados y cerdos de producción): 2 ml/cerdo a partir de las 6 semanas de edad, independientemente de su peso, edad y sexo.

FORMA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello, detrás de la base de la oreja.

PROGRAMA VACUNAL ORIENTATIVO:

Cerdas gestantes: Vacunar a los 40-45 días antes del parto, revacunando 21 días después (20 - 25 días antes del parto). A partir de aquí, revacunar en cada posterior gestación, 1 mes aproximadamente, antes del parto.

Verracos: Vacunación de todos los animales, revacunándolos a los 21 días. Revacunaciones posteriores cada 6 meses.

Cochinos desestetados: Vacunar a los 40-45 días de vida, revacunándolos a los 60-65 días de vida.

Cerdos de producción: Vacunación de todos los cerdos, al llegar a la explotación. Revacunar 3 semanas después.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

- Vacunar únicamente animales sanos.
- Usar material estéril para su administración.
- Desinfectar el punto de inoculación.
- El uso de la vacuna será inmediata una vez abierto el envase.
- Agitar antes de usar.
- Administrar la vacuna cuando esté a una temperatura de unos +15 a +25 °C.

REACCIONES ADVERSAS:

- Pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad en animales vacunados, en cuyo caso debe administrarse un antihistamínico.
- En caso de inoculación defectuosa en tejido subcutáneo pueden aparecer reacciones locales que remiten a los pocos días.
- Debido al adyuvante utilizado pueden producirse en algunos animales reacciones locales en el punto de inoculación que desaparecen a los pocos días.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA:

Puede administrarse en cualquier estadio de gestación o lactación.

TIEMPO DE ESPERA:

0 días.

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

En caso de inyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el texto del envase o el prospecto.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Guardar en un lugar oscuro entre +2 y +8 °C. No congelar.

PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO Y/O LOS ENVASES:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

PRESENTACIÓN:

Frasco 50 ds (100 ml).

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria

USO VETERINARIO

NEUMOSUIN

Inactivated vaccine against Swine pleuropneumonia, in injectable suspension

COMPOSITION:

Inactivated *Actinobacillus pleuropneumoniae* (serotypes 2, 4 and 5).

Active stimulation of the immune system of animals vaccinated against *Actinobacillus pleuropneumoniae*, the causal agent of Porcine Pleuropneumonia.

INDICATIONS:

Swine (gestating sows, boars, weaned piglets and swine for production): To prevent swine Pleuropneumonia.

DOSAGE:

Swine (gestating sows, boars, weaned piglets and swine for production): 2 ml/pig, from 6 weeks of age, for all weights, ages and sex.

ADMINISTRATION ROUTE AND FORM:

Deep intramuscular injection, into the neck muscles, behind the base of the ear.

ORIENTATIONAL VACCINATION PROGRAMME:

Gestating sows: Vaccinate at 40-45 days before farrowing and revaccinate 21 days later (20-25 days before farrowing). Thereafter, revaccinate at approximately one month before farrowing.

Boars: Vaccinate all animals, revaccinating 21 days later. Afterwards, administer one dose every 6 months.

Weaned piglets: Vaccinate at 40-45 days of age, revaccinating when 60-65 days old.

Swine for production: Vaccinate all pigs when entering the premises. Revaccinate 3 weeks later.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR USE:

- Vaccinate only healthy animals.
- Use sterile material when administering.
- Disinfect the application site.
- Use the vaccine immediately after the container has been opened.
- Administer the vaccine at a temperature between +15 and +25 °C.
- Shake before use.

ADVERSE REACTIONS

Cases of hypersensitivity to the vaccine may occur in some animals, in which case administer an antihistamine.

In the event of an incorrect inoculation, local reactions may appear in subcutaneous tissue, which will disappear after a few days.

Due to the type of adjuvant used, local reactions at the inoculation site may occur in some animals, which disappear in a few days.

USE DURING PREGNANCY AND LACTATION:

Can be administered at any time during pregnancy and lactation.

WITHDRAWAL PERIOD:

0 days.

SPECIAL PRECAUTIONS:

If you are accidentally injected with this product, seek prompt medical advice and take the package leaflet with you.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR STORAGE:

Store in a dark place between +2 and +8 °C. Do not freeze.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR THE DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCT OR WASTE MATERIALS, IF ANY:

Any unused veterinary medicinal product or waste materials derived from such veterinary medicinal products should be disposed of in accordance with local regulations.

PRESENTATION:

Bottle of 50 ds (100 ml).

Under veterinary prescription

FOR VETERINARY USE ONLY



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com

78200-16



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com

02-16